

# LA SFIDA DELLA NONSCELTA

fonte: <http://www.unfairchoice.info/popquizgeneral.htm>

## Parte I - Prima dell'aborto

- 1. Quale percentuale di donne che abortiscono si sentono spinte ad abortire da altre persone?**  
(a) 12% (b) 51% (c) 27% (d) 64% (e) 15% (f) 32%
- 2. Chi è il killer n°1 delle donne incinte?**  
(a) cancro al seno (b) malattia cardiaca (c) errore medico (d) diabete gestazionale (e) fumo passivo (f) omicidio
- 3. Quante donne si sentono incerte quando abortiscono?**  
(a) 12% (b) 54% (c) 93% (d) 22% (e) 48% (f) 26%
- 4. Quante donne si sentono affrettate quando abortiscono?**  
(a) 12% (b) 52% (c) 93% (d) 22% (e) 48% (f) 26%
- 5. Quante donne non hanno ricevuto assistenza dalla clinica o da altri enti che hanno effettuato l'aborto?**  
(a) 0-10% (b) 28% (c) 41% (d) 67% (e) 76% (f) 83%
- 6. Quante donne pensano di non aver ricevuto assistenza adeguata prima dell'aborto?**  
(a) 2-7% (b) 11-29% (c) 51% (d) 79% (e) 84% (f) 92%
- 7. Quante non sono state informate da chi ha effettuato l'aborto di alternative disponibili?**  
(a) 81% (b) 79% (c) 11% (d) 66% (e) 79% (f) 82%
- 8. Se un'adolescente ha abortito negli ultimi sei mesi, quanto è più probabile che si suicidi?**  
(a) il doppio (b) 3-4 volte (c) 5,5 volte (d) 6 volte (e) 8,2 volte (f) 15 volte

## Parte II - Dopo l'aborto

- 9. Quante donne che hanno abortito dichiarano di aver avuto complicanze fisiche dopo l'aborto?**  
(a) 2,75% (b) 5% (c) 13,2% (d) 28% (e) 31% (f) 78%
- 10. Quale percentuale di donne che hanno abortito hanno complicanze immediate e che possono mettere a rischio la vita?**  
(a) 1% (b) 1,3% (c) 2% (d) 10% (e) 25% (f) 50%
- 11. Quanto è più alto il rischio di depressione clinica tra le donne che abortiscono rispetto a quelle che partoriscono?**  
(a) del 3% (b) del 65% (c) del 10% (d) del 26,2% (e) del 5% (f) del 73%
- 12. Quale percentuale di donne ha sintomi del disturbo da stress post-traumatico dopo l'aborto?**  
(a) nessuna (b) 6% (c) 22% (d) 42% (e) 58% (f) 65%
- 13. Considerando le diverse cause di morte, quanto è più alta la percentuale di morti tra donne che abortiscono rispetto a quelle che partoriscono?**  
(a) circa la stessa (b) il doppio (c) 3,5 volte (d) 5 volte (e) 10 volte (f) 22 volte
- 14. Quante donne intervistate dopo l'aborto hanno risposto che "Una parte di me è morta" ?**  
(a) 11,5% (b) 30% (c) 45% (d) 53% (e) 60% (f) 71%
- 15. Quant'è il tasso di suicidio tra donne che hanno abortito rispetto al tasso di suicidio delle donne che hanno partorito?**  
(a) 6 volte (b) il doppio (c) 4,3 volte (d) 5-6 volte (e) 8 volte (f) 9-10 volte
- 16. Di quanto l'aborto aumenta il rischio della donna di aborti spontanei in futuro?**  
(a) 60% (b) 20% (c) 44% (d) 38% (e) 32% (f) 28%

risposte nella pagina seguente

## Parte I

1. d) 64%<sup>1</sup>
2. f) omicidio<sup>2</sup>
3. b) 54%<sup>1</sup>
4. b) 52%<sup>1</sup>
5. d) 67%<sup>1</sup>
6. e) 84%<sup>1</sup>
7. e) 79%<sup>1</sup>
8. d) 6 volte più probabile<sup>3</sup>

## Parte II

9. e) 31%<sup>4</sup>
10. d) 10%<sup>5</sup>
11. b) rischio del 65% in più<sup>6</sup>
12. f) 65%<sup>1</sup>
13. c) 3,5 volte più alto<sup>7</sup>
14. e) 60%<sup>1</sup>
15. a) 6 volte più alto<sup>8</sup>
16. a) 60%<sup>9</sup>

Per maggiori informazioni – compresi collegamenti a ricerche pubblicate, testimonianze personali e risorse facili da usare – visitate [www.unchoice.info](http://www.unchoice.info)

traduzione in italiano di Giovanni Corbelli

<http://postaborto.blogspot.com>  
[afterabortion@gmail.com](mailto:afterabortion@gmail.com)

- <sup>1</sup> Rue et. al., "Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American and Russian women," *Medical Science Monitor* 10(10): SR5-16, 2004.
- <sup>2</sup> I.L. Horton and D. Cheng, "Enhanced Surveillance for Pregnancy-Associated Mortality-Maryland, 1993-1998," *JAMA* 285(11): 1455-1459 (2001); J. McFarlane et. al., "Abuse During Pregnancy and Femicide: Urgent Implications for Women's Health," *Obstetrics & Gynecology* 100: 27-36 (2002).
- <sup>3</sup> Garfinkel et al., "Stress, Depression and Suicide: A Study of Adolescents in Minnesota," *Responding to High Risk Youth* (U. of Minnesota: Minnesota Extension Service, 1986)
- <sup>4</sup> Garfinkel et al., "Stress, Depression and Suicide: A Study of Adolescents in Minnesota," *Responding to High Risk Youth* (U. of Minnesota: Minnesota Extension Service, 1986)
- <sup>5</sup> Frank, et.al., "Induced Abortion Operations and Their Early Sequelae," *Journal of the Royal College of General Practitioners* 35(73):175180, April 1985; Grimes and Cates, "Abortion: Methods and Complications", in *Human Reproduction*, 2nd ed., 796-813; M.A. Freedman, "Comparison of complication rates in first trimester abortions performed by physician assistants and physicians," *Am. J. Public Health* 76(5):550-554, 1986).
- <sup>6</sup> JR Cougle et. al., "Depression Associated With Abortion and Childbirth: A Long-Term Analysis of the NLSY Cohort," *Medical Science Monitor* 9(4):CR105-112, 2003.
- <sup>7</sup> M Gissler et. al., "Pregnancy Associated Deaths in Finland 1987-1994 -- definition problems and benefits of record linkage," *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* 76:651-657, 1997; M. Gissler, "Injury deaths, suicides and homicides associated with pregnancy, Finland 1987-2000," *European J. Public Health* 15(5):459-63, 2005 . This study looked at death rates for up to one year after the pregnancy ended. Another study found that, compared to women who gave birth, women who had abortions had a 62% higher risk of death from all causes for at least *eight* years after their pregnancies. See DC Reardon et. al., "Deaths Associated With Pregnancy Outcome: A Record Linkage Study of Low Income Women," *Southern Medical Journal* 95(8):834-41, Aug. 2002.
- <sup>8</sup> M. Gissler et. al., "Injury deaths, suicides and homicides associated with pregnancy, Finland 1987-2000," *European J. Public Health* 15(5):459-63, 2005; Gissler et. al., "Suicides After Pregnancy in Finland: 1987-94: register linkage study," *British Medical Journal*, 313: 1431-1434, 1996. This looked at suicide rates for an average for up to one year after the end of the pregnancy. Another study that looked at suicide rates for up to *eight* years after the pregnancy ended found that women who aborted had a 2.5 times higher suicide rate. See DC Reardon et. al., "Deaths Associated With Pregnancy Outcome: A Record Linkage Study of Low Income Women," *Southern Medical Journal* 95(8):834-41, Aug. 2002.
- <sup>9</sup> N. Maconochie, P. Doyle, S. Prior, R. Simmons, "Risk factors for first trimester miscarriage – results from a UK-population-based case- control study," *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, Dec 2006.